


Potraty v Slovenskej republike 2020

Údaje o počte potratov sú získavané štatistickým zisťovaním MZ SR Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva Z (MZ SR) 7-12, ktorého zber a spracovanie vykonáva Národné centrum zdravotníckych informácií. Podľa štatistík za rok 2020 bol vykázaný medziročný pokles potratov. Znížil sa počet umelých prerušení tehotenstva a navýšili sa potraty z dôvodu mimomaternicových tehotenstiev.

Zdravotnícke zariadenia SR zaznamenali v roku 2020 spolu 13 469 potratov, z toho potraty žien bez trvalého bydliska v SR tvorili 731 prípadov. Oproti predchádzajúcemu roku sa celkový počet potratov znížil o 1 637 na 13 469 potratov, čo je najnižšia hodnota za sledované obdobie od roku 1997 (v roku 1997 bolo 27 817 potratov). K poklesu došlo najmä u umelých prerušení tehotenstva (UPT), kde sme zaznamenali 6 177 prípadov, čo je o 976 menej ako v roku 2019. Významný vplyv na pokles UPT mal celkovo nižší počet potratov žien s trvalým bydliskom mimo SR. Kým v roku 2019 bolo u žien s trvalým bydliskom mimo SR vykonaných 1 346 potratov (z toho 1 329 UPT), v roku 2020 to bolo 731 potratov (z toho 717 UPT).

Potraty z dôvodu mimomaternicových tehotenstiev v porovnaní s minulým rokom vzrástli o 42 na 513 prípadov v roku 2020. Spontánne potraty (48,8 %) a umelé prerušenia tehotenstva (45,9 %) tvorili vyrovnaný podiel, po nich nasledovali mimomaternicové tehotenstvá (3,8 %) a ostatné potraty (1,6 %) (G 1).

G 1 Podiel potratov podľa druhu potratu



Graf uvádza potraty žien s trvalým bydliskom v SR aj bez trvalého bydliska v SR.
V publikačných tabuľkových výstupoch (XLSX, ODS) vychádza tento graf z dát na hárku T1.1.

Podľa územia zdravotníckeho zariadenia bolo najviac umelých prerušení tehotenstva vykonaných v Nitrianskom kraji (27,6 %), nasledoval Bratislavský (14,8 %), Košický (14,0 %) a Banskobystrický (13,6 %) kraj, najmenej UPT bolo v Prešovskom kraji (5,5 %).


So zreteľom na vek plodu bolo najviac spontánnych potratov v 8. týždni (15,9 %), umelých prerušení tehotenstva v 7. týždni (23,8 %), potratov z dôvodu mimomaternicového tehotenstva v 6. týždni (20,3 %) a ostatných potratov v 9. týždni (17,1 %).

Potraty žien s trvalým bydliskom v SR

Za rok 2020 evidujeme 12 738 potratov u žien s trvalým bydliskom v SR, čo je o 1 022 potratov menej oproti predchádzajúcemu roku. Najväčší podiel predstavovali spontánne potraty (51,5 %), nasledovali umelé prerušenia tehotenstva (42,9 %), mimomaternicové tehotenstvá (4,0 %) a ostatné potraty (1,6 %).

Index potratovosti (počet potratov na 100 narodených) klesol oproti minulému roku o 1,6 bodu na hodnotu 22,4, čo je najnižšia hodnota v sledovanom období od roku 1997. **Všeobecná miera potratovosti** klesla na 10,0 potratov na 1 000 žien v reprodukčnom veku, čo je tiež najnižšia hodnota od roku 1997 (G 2).

G 2 Všeobecná miera potratovosti



Graf uvádza potraty žien s trvalým bydliskom v SR.

V publikačných tabuľkových výstupoch (XLSX, ODS) je tento graf uvedený pod označením G 2 (Hárok T1.2).

Znak zlom (↗) znamená, že ide o prerušenie porovnateľnosti časového radu z metodických dôvodov.

Umelé prerušenia tehotenstva žien každým rokom klesajú. Počet UPT sa medziročne znížil o 364 potratov z 5 824 v roku 2019 na 5 460 v roku 2020. Všeobecná miera umelej potratovosti (G 2) v sledovanom roku klesla o 0,2 ‰ oproti roku 2019 a predstavovala 4,3 ‰. Od roku 1997 (14,6 ‰) klesla o 10,3 bodov. Najviac potratov na 1 000 žien v danom veku pripadalo v roku 2020 na ženy vo veku 20 – 24 rokov (6,7 ‰), nasledovali 25 – 29-ročné (6,5 ‰), 30 – 34-ročné (6,1 ‰) a 35 – 39-ročné (5,3 ‰).

Z hľadiska kraja trvalého bydliska ženy sme najvyššiu všeobecnú mieru umelej potratovosti zaznamenali v Nitrianskom (6,1 ‰) a Banskobystrickom kraji (5,8 ‰), naopak najnižšiu v Prešovskom (2,7 ‰) a Žilinskom kraji (3,2 ‰).

Spontánne potraty v roku 2020 predstavovali 51,5 % (6 558) všetkých potratov žien s trvalým bydliskom v SR. Všeobecná miera spontánnej potratovosti bola na úrovni 5,1 ‰, čo je mierny medziročný pokles. Najviac spontánnych potratov pripadalo na ženy vo veku 25 – 29 rokov (8,7 na 1 000 žien v danom veku) a 30 – 34 rokov (8,6/1 000).

Po zohľadnení kraja trvalého bydliska ženy sme zaznamenali najvyššiu mieru spontánnej potratovosti v Trnavskom (6,1 na 1 000 žien v reprodukčnom veku) a Prešovskom kraji (5,9 ‰), najnižšiu potom v Žilinskom (4,6 ‰), Bratislavskom (4,6 ‰) a Trenčianskom kraji (4,5 ‰).

Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch zverejnených na http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy/Gynekologia_Porodnictvo_Potraty/Potraty/Pages/default.aspx.